

Comenzar y mantener el rumbo con WAKIX® (pitolisant)

WAKIX es un **comprimido de una vez al día** que está **aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para tratar la somnolencia diurna excesiva (SDE) o la cataplejía en adultos con narcolepsia.**

Cuando comienza a tomar un medicamento, especialmente uno para un trastorno crónico como la narcolepsia, es importante que hable con su proveedor de atención médica para que él o ella pueda ayudarlo a comprender qué esperar con el tratamiento.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de empezar a tomar WAKIX?



Antes de comenzar a usar WAKIX, informe a su proveedor de atención médica si usted:

- Es alérgico al pitolisant o a cualquier componente de WAKIX
- Tiene o ha tenido alguna afección médica, incluidos problemas de corazón, hígado o riñón
- Está tomando otros medicamentos
- Está embarazada o planifica quedar embarazada

¿Cómo debo tomar WAKIX?



Los comprimidos de WAKIX se toman **una vez al día por la mañana, ni bien se despierta.**

Si omite una dosis, tome la siguiente dosis a la mañana siguiente, en cuanto se despierte. **Siempre tome WAKIX exactamente como se lo haya recetado su proveedor de atención médica.** Dependiendo de su dosis, puede tener que tomar más de un comprimido.

TOME WAKIX

- ✓ Por la mañana, ni bien se despierta
- ✓ Una vez al día
- ✓ Todos los días

NO TOME WAKIX

- ✗ Más tarde ese mismo día
- ✗ Más de una vez al día
- ✗ Solo en determinados días

¿Qué debo esperar cuando tomo WAKIX?

Los siguientes son algunos puntos para analizar con su proveedor de atención médica:



WAKIX no es un estimulante

La forma en que se siente su cuerpo al tomar WAKIX puede ser diferente de la forma en que se sentía con los medicamentos que tomó en el pasado.



Es importante darle tiempo a WAKIX para que actúe

Cada persona responde de forma diferente a los medicamentos. Es importante saber que WAKIX puede tardar un tiempo en actuar y, en algunas personas, **podría tardar hasta 8 semanas** para lograr una respuesta.



Comente su progreso con su proveedor de atención médica

Hable sobre cómo se siente después de comenzar a tomar WAKIX:

- Infórmele sobre cualquier **mejora** que note y sobre **cualquier posible efecto secundario.**
- **No interrumpa ni cambie la dosis por su cuenta** sin hablar primero con su proveedor de atención médica.
- Su médico puede ajustarle la dosis de WAKIX para encontrar una dosis que sea adecuada para usted.

Información importante de seguridad

No tome WAKIX si es alérgico al pitolisant o a cualquier ingrediente de WAKIX, o si tiene enfermedad hepática grave.

Wakix
pitolisant tablets

Consulte la continuación de la Información importante de seguridad en la página siguiente y la Información de prescripción completa adjunta.

Información de seguridad importante (continuación)

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si tiene irregularidades en el ritmo cardíaco, si nació con una afección cardíaca o si sus niveles de electrolitos en la sangre son demasiado altos o demasiado bajos. WAKIX® (pitolisant) tiene un efecto en la actividad eléctrica del corazón conocida como prolongación del intervalo QT. Los medicamentos con este efecto pueden provocar alteraciones en el ritmo cardíaco, que son más probables en pacientes con factores de riesgo, como ciertas afecciones cardíacas, o cuando se toma en combinación con otros medicamentos que afectan el intervalo QT. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los demás medicamentos que toma.

El riesgo de prolongación del intervalo QT puede ser mayor en pacientes con enfermedad hepática o renal. WAKIX no se recomienda en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal.

Los efectos secundarios más frecuentes observados con WAKIX fueron insomnio, náuseas y ansiedad. Otros efectos secundarios incluyeron dolor de cabeza, infección de las vías respiratorias superiores, dolor musculoesquelético, aumento del ritmo cardíaco y disminución del apetito. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de WAKIX. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma o planea tomar, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre. Algunos medicamentos pueden aumentar la cantidad de WAKIX que ingresa en la sangre y algunos medicamentos pueden disminuir la cantidad de WAKIX que ingresa en la sangre. Puede ser necesario ajustar la dosis de WAKIX si está tomando estos medicamentos.

WAKIX también puede disminuir la efectividad de algunos medicamentos, incluidos los métodos anticonceptivos hormonales. Debe usar un método anticonceptivo no hormonal alternativo durante el tratamiento con WAKIX y durante al menos 21 días después de discontinuar el tratamiento.

Informe a su proveedor de atención médica si está embarazada o planea quedar embarazada. Existe un registro de exposición durante el embarazo que monitorea los desenlaces de los embarazos en mujeres expuestas a WAKIX durante el embarazo. Se recomienda que se inscriba en el registro de embarazos de WAKIX si queda embarazada mientras toma WAKIX. Para inscribirse u obtener información del registro, llame al 1-800-833-7460.

No se ha establecido la seguridad ni la efectividad de WAKIX en pacientes menores de 18 años de edad.

Se recomienda que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088. También puede informar los efectos secundarios negativos a Harmony Biosciences al 1-800-833-7460.

Consulte la Información de prescripción completa adjunta.



Escuche a personas reales que toman WAKIX en
WAKIX.com



WAKIX es una marca comercial registrada de Bioprojet Europe, Ltd.
El nombre y logotipo de Harmony Biosciences son marcas comerciales registradas.
© 2023 Harmony Biosciences. Todos los derechos reservados.
US-WAK-2400028/Mar 2024

